

Neue Vogelarten von Kamerun.

Von

Y. Sjöstedt.

(Gothenburg, Schweden, 14. Juli 1892.)

Unter den Vögeln, die ich von Kamerun (West-Afr.) nachhause mitbrachte, habe ich folgende neue Arten gefunden, deren Diagnosen im „Journal für Ornithologie“ einzuführen ich mir erlaube.

Cuculus Aurivillii n. sp.

♂

Supra niger nitore chalybeo, scapularibus, tectricibus alarum minoribus non sine nitore metallico-virescente. Remigibus supra nigro-fuscis subtus dilutioribus; margine interno albo-variegato. Cauda chalybeo-nigra, im maculata. Mento, gula, colli lateribus, pectore superiore badiis chalybeo-fusco fasciatis. Abdomine rufescenti-albido colore dorsi fasciato. Subcaudalibus abdomine concoloribus, infasciatis; maxima nigro-maculata. Macula albida ante oculos parva. Pedibus fere albis. Iride fusca. Maxilla fusco-cornea; mandibula pallida dimidio superiore nigricante. Long. 31 cm, Ala 16,5 cm, Cauda 15,5 cm, Iride fusca 7 mm.

Ekundu N'Dene Febr. 1892.

Malimbus rachiliae.

♀ adhuc ignota.

Nigerrimus nitore coracino; scuto pectorali, medio coccineo tincto, et subcaudalibus croceis, plumis basi pure albis. Rostro splendide nigro. Pedibus holoscericeis. Iride fusco-rubra 5 mm, Long. 14 cm, Caud. 4,7 cm, Ala 7,8 cm.

N'Dian Juni 1991.

Campothera Tullbergi n. sp.

♀ ad.

Supra viridi-olivaceus, fulvescens. Uropygio tectricibusque alarum dorso concoloribus. Remigibus brunneo-fuscis; minoribus extus, majoribus in margine externo versus basin (duabus primis

exceptis) olivaceo-viridibus. Pogoniis internis maculis flavo-albidis ornatis. Scapis remigum brunneo-nigris, subtus pallide flavescens. Angulo carpali alae macula sanguinea magna notato. Rectricibus immaculatis supra olivaceo-brunneis subtus flavido-viridibus, scapis supra brunneis subtus flavis. Pilio nigro, plumis versus basin cinereis apicem versus viridi-flavis. Macula parva ante oculos rubra. Gula, collo, pectore superiore lateribusque capitis flavo-albidis, viridi-fusco punctatis. Thorace, abdomine, subcaudalibus flavis viridi-fusco maculatis. Maculis in thorace rotundatis, rarioribus. Lateribus fasciatis; abdomine medio immaculato. Subalaribus fusco variegatis, remigum scapis fere concoloribus. Iride rubra 5,5 mm, Long. 19 cm, Rostr. 2,2 cm, Ala 11,1 cm, Cauda 7,0 cm.

Itoki Na N'Golo Juni 1891.

Briefliches aus Tunesien.

Von

Stanislas Alessi.

Uova di *Alaemon Margaritae*.

Il giorno 17. Marzo 1892 trovandomi in Gabes, mi arabo al quale avevo dato incarico di portarmi le uova ed i nidi che per caso avesse potuto trovare cacciando, mi portava un nido contenente 3 uova, e con esso l'uccello madre ucciso, come io gli avevo detto di fare, per potermi rendere conto della specie a cui appartenevano le uova che mi avrebbe portate. — L'uccello era mi *Alaemon Margaritae* ♀ che osservato minutamente presentava tutti i segni di un lavoro d' incubazione avanzato. — Il nido e le uova per quanto a primavista si poteva dire che appartenessero al genere delle lodole, pure presentavano un apparenza nuova. — Le uova contenevano un embrione talmente sviluppato che non potei vuotarle senza far loro soffrire alcun che di guasto. —

Per quanto convinto che le uova dovessero appartenere all' *Alaemon Margaritae*, pure aspettavo prove maggiori per poterlo assicurare senza dubbio alcuno.

Il giorno 8 aprile 1892 trovandomi a caccia in prossimità